

Les Élastiques Inter Maxillaires

Cette étape est l'une des plus importantes du traitement orthodontique. Les élastiques vont permettre d'emboîter convenablement les dents entre elles.

La durée de cette étape est différente pour chaque patient. Elle ne s'achèvera que lorsque la correction nécessaire aura été obtenue.

Port des élastiques

Ils doivent être portés en permanence à l'exception des repas et du brossage des dents.

Porter les élastiques à mi-temps ne donne le plus souvent aucun résultat.

Ils doivent être changés au moins une fois par jour pour maintenir une force régulière.

Il faut toujours avoir des élastiques de rechange sur soi pour parer à tout imprévu.


La position des élastiques est différente suivant chaque patient.

Il faut impérativement suivre le schéma indiqué au verso.

Doubler le nombre des élastiques n'accélère pas les mouvements des dents.

Les dents peuvent être sensibles au début du port des élastiques.

Si vous manquez d'élastiques, n'hésitez pas à venir en demander à l'accueil.



Pas de port des élastiques =

Pas de mouvement des dents = Pas de correction


Docteur Jérôme CHAPUIS

3, rue du 11 Novembre 1918 - 38110 - La Tour Du Pin

drchapuis@hotmail.com

Côté droit

Côté gauche



Quadrant 1

Quadrant 2

Quadrant 4

Quadrant 3

